

Reprezentatywne okazy różnorodności biologicznej

Do najrzadszych i najbardziej interesujących gatunków roślin występujących na Śląsku Opolskim zaliczyć należy m.in.:

Długosz królewski

– okazała paproć, jedna z najwyższych w Polsce. Ponoć wczesnym latem masowo siadają na niej robaczki świętojańskie. Dało to początek legendzie o kwiecie paproci.

Len austriacki

– występuje w miejscach suchych i nasłonecznionych. W Ligocie Dolnej len austriacki został po raz pierwszy odnaleziony w murawach porastających stare wykopy pod autostradą, a obecnie po wybudowaniu autostrady A4 rozprzestrzenił się na nowopowstałe skarpy.



len austriacki

Lindernia mułowa

– pojawia się w miejscach zalewanych przez rzeki i na dnach wysychających stawów. Zagrożeniem dla tego gatunku jest intensywna gospodarka rybacka na stawach hodowlanych, która nie dopuszcza do powstania odpowiednich siedlisk.

Kotewka orzech wodny

– jej owocem jest duży orzech z czterema rogami zakończonymi ostrymi harpunami umożliwiającymi jego zakotwiczenie na dnie. Na Opolszczyźnie występuje w kilkunastu miejscach. Najgroźniejszym dla niej jest wprowadzanie roślinożernych gatunków ryb, np. amura białego.



kotewka orzech wodny

Kruszczyk drobnolistny

– storczyk o drobnych liściach, osiągnący 5 do 15 cm wysokości. Rośnie w lasach liściastych, szczególnie bukowych. W województwie opolskim występuje w okolicach Kamienia Śląskiego oraz ostatnio na Górze Szpicy koło Gogolina.



kruszczyk drobnolistny

Niewątpliwie najbardziej znaczącymi w ochronie przyrody tego regionu grupami zwierząt są ptaki i nietoperze oraz płazy, gady i bezkręgowce. Najciekawsze z nich to m.in.:


Pachnica dębowa

– bardzo rzadki w Polsce gatunek chrząszcza, spotykany na starych drzewach, głównie dębach. Na Opolszczyźnie stwierdzony m.in. w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz w dolinie Małej Panwi koło Zawadzkiego.

Parku Krajobrazowym. Ten orzeł jest symbolem naszego kraju.

Derkacz

– gatunek ptaka zagrożony w skali światowej. Spotykany na podmokłych łąkach. Na Śląsku Opolskim notowany na rozproszonych stanowiskach w dolinach rzek, m.in. Odry i Małej Panwi.



ślady działalności borów w dolinie Małej Panwi

Bóbr

– największy z naszych gryzoni występował na Śląsku Opolskim jeszcze na przełomie XV i XVI w. Wymarł z powodu pozyskiwania futer, mięsa oraz piżma. Dopiero w 1996 r. przeprowadzono reintrodukcję bobra w Dolinie Widawy koło Namysłowa, a później w Dolinie Budkowiczanki, Złotego Potoku w Górach Opawskich. Część bobrów migrowała, bo pojawiły się m.in. w okolicach Pokoju oraz w Dolinach Małej Panwi i jej dopływu Libawy. Obecnie spoty-



gniewosz plamisty

Gniewosz plamisty

– gatunek należący do węży dusicieli. Spotykany w okolicach Góry Świętej Anny, Gogolina, Góraźdy, Strzelec Opolskich oraz w Dolinie Małej Panwi.

Bielik

– gniazduje nielicznie w dużych kompleksach leśnych, m.in. w Stobrawskim

kany jest bardzo często w większości rzek w naszym regionie.

Suseł moregowany

– do niedawna w Polsce gatunek wymarły. W 2005 r. został reintrodukowany z powodzeniem w okolice Kamienia Śląskiego, gdzie były jego ostatnie naturalne populacje.